

Badanie przesiewowe krwi na obecność wirusa HCV (poziom p/ciał anty-HCV)

W pobranej próbce krwi określana jest reaktywność (obecność) p/ciał anty-HCV i na tej podstawie można wnioskować o obecności/kontakcie z wirusem HCV. Jest to badanie jakościowe a interpretacja wyniku może być następująca:

1. HCV Przeciwciała $< 0,9$ – niereaktywne (-)

jest to wynik prawidłowy.

2. HCV Przeciwciała $0,9 - 1,0$ – wartość graniczna (+/-)

jest to wynik sugerujący ponowne oznaczenie p/ciał anty-HCV za 3 – 4 tygodnie.

3. HCV Przeciwciała $> 1,0$ – powtarzalnie reaktywne (+)

jest to wynik nieprawidłowy, wymagający konsultacji lekarskiej.

UWAGA: W niektórych rzadkich przypadkach do wydania wyniku niezbędne będzie pobranie drugiej próbki krwi.

Badanie wątroby przy użyciu metody elastografii

Badanie służące bezinwazyjnej i bezpiecznej ocenie stopnia zwłóknienia oraz stłuszczenia wątroby.

Badanie przy użyciu tego sprzętu jest nieinwazyjne i bezbolesne, nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Na badanie można umówić się bez skierowania. Może na nie również skierować lekarz prowadzący albo specjalista hepatolog.

Badanie trwa krótko a wynik jest uzyskany natychmiast po zakończeniu, co pozwala ocenić stan wątroby przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie tego leczenia (badanie podobne do badania USG).

Badanie nie powinno być wykonywane w przypadku:

- pacjentów z rozrusznikami serca i innymi urządzeniami elektronicznymi podłączonymi na stałe;
- kobiet ciężarnych,
- pacjentów ze znaczną otyłością i wodobrzuszem;
- innych narządów niż wątroba.